

**L'OLIVICOLTURA
IN PROVINCIA
DI SALERNO**


Superficie non in produzione

Ha 21

- Superficie in produzione

Ha. 38.870

**COMUNI CON SUPERFICIE
OLIVETATA SUPERIORE A 500 HA**



LE PRINCIPALI CULTIVAR D'OLIVO DEL COMPRENSORIO SELE-TANAGRO

Carpellese

Sinonimi: Olivo piangente, Salicegna, Olivo pendente, olivo a grappolo.



foto 8 Pianta d'olivo della cultivar carpellese



foto 9 Rami d'olivo della cultivar carpellese con frutti

Area di coltivazione

Cultivar da olio campana, diffusa soprattutto nel Salernitano. L' area di maggior diffusione ricade nel territorio dei comuni: Buccino, Auletta, Polla, Salvitello, Pertosa, Contursi T., Campagna, Eboli, Oliveto Citra, valva ecc.

L' albero è di medio sviluppo, svasato e con chioma provvista di molti rami penduli, lunghi e sottili che danno l'aspetto saliciforma. Il colore della chioma è verde scuro.

- La foglia è lanceolata con apice acuto leggermente mucronato con margini curvati verso il basso, le dimensioni variano: la lunghezza da mm 58 a mm 97, la larghezza massima mm10 a mm 25. Il colore della pagina superiore è verde scuro e grigio biancastro dalla pagina inferio-

re. Il picciolo è lungo e contorto.

L'infiorescenza è lunga e rada, di forma paniculata. Il numero dei fiori varia da 9 a 28 con un n° medio di 18 per mignola.

Il frutto è obovato allungato, con tendenza al piriforme, con apice arrotondato e provvisto talvolta di breve punta, di media grandezza. La maturazione inizia nel mese di novembre e si completa nel tardo inverno. Le olive danno una elevata resa in olio (circa 23%) di buona qualità.

Rotondella

Sinonimi: Tonnella, romanella, marinella, nostrale, olivella.



foto 10 Pianta d'olivo della cultivar Rotondella



foto 11 Rami d'olivo della cultivar Rotondella con frutti

Area di coltivazione

Cultivar da olio presente in tutte le aree olivetate del Salernitano.

L'albero è molto vigoroso con chioma raccolta in senso trasversale. La

pianta si presenta con molti rami assurgenti e con scarsa tendenza a formare polloni alla basa. Il colore della chioma è argenteo.

La foglia è piccola e leggermente mucronata, la lunghezza varia da mm 70 a mm 75, la larghezza massima varia da mm 10 a mm 16. La pagina superiore della foglia è di colore verde scuro ed è ricoperta da una leggera fuliggine di colore grigio, e argenteo con riflessi giallo paglierino quella inferiore. Il picciolo è corto

L'infiorescenza è corta e rada con mignole che non superano mm 29 di lunghezza, la forma è paniculata espiciforme. Il numero dei fiori per migliola varia da 10 a 32.

Il frutto è obovato-gibboso, con apice mucronato, è di media grandezza. Il peso della drupa varia g 1,5 a 2,2. La maturazione è precoce. La resa in olio oscilla intorno 20%.

Frantoio

Cultivar da olio presente in tutte le aree olivetate del comprensorio Sele-Tanagro. L'albero è di media altezza, la chioma molto larga, branche tortuose, inclinate. I rami a frutti sottili, pendenti e lunghi. La foglia di forma lanceolata, di colore verde nella pagina superiore e argentea nella inferiore. L'infiorescenza è a grappolo con un numero medio di 15-18 fiori e autofertile. Il frutto (drupe) di media grandezza e di forma ovoide-allungato, la maturazione è scalare e alla raccolta il colore della buccia (epidermide) varia dal verde chiaro al vinoso scuro. Le olive danno una elevata resa in olio (circa 22%) di buona qualità.

L'olio della categoria extra vergine organoletticamente ha un buon fruttato.

Altre Varietà d'olive presente nel comprensorio Sele-Tanagro:

- leccino,
- coratina,
- moraiolo,
- carolea,
- pendolino
- ogliarola.